

PROSPECTO

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Vd. personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es Postinor 750 mcg comprimidos y para qué se utiliza
2. Antes de tomar Postinor 750 mcg comprimidos
3. Cómo tomar Postinor 750 mcg comprimidos
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Postinor 750 mcg comprimidos

Postinor 750 mcg comprimidos

Levonorgestrel

El principio activo es levonorgestrel. Cada comprimido contiene 750 microgramos
Los excipientes son almidón de patata, almidón de maíz, sílice coloidal anhidra, estearato de magnesio, talco, lactosa monohidrato.

Titular de la autorización de comercialización:

Medimpex UK Limited
127 Shirland Road
Londres W9 2EP
Reino Unido

Responsable de la fabricación:

Schering AG
13342 Berlín
Alemania

1. QUÉ ES POSTINOR 750 mcg comprimidos Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Postinor se presenta en forma de comprimidos. Cada envase contiene 2 comprimidos de forma redonda y color blanco.

Pertenece al grupo de los anticonceptivos orales.

Postinor está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.

POSTINOR SOLO SE DEBE EMPLEAR COMO MEDIDA DE EMERGENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO.

2. ANTES DE TOMAR POSTINOR 750 mcg comprimidos

La anticoncepción de emergencia es un método de uso ocasional. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional.

La anticoncepción de emergencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en el que se produjeron las relaciones sexuales sin protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, se debe considerar la posibilidad de embarazo. Si se mantiene una relación sexual durante el tratamiento con Postinor, la prevención del embarazo puede no ser eficaz. Deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días o se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla por cualquier otro motivo.

Si se produjera un embarazo tras el tratamiento con Postinor, se debe considerar la posibilidad de un embarazo ectópico. Es probable que el riesgo absoluto de aparición de un embarazo ectópico sea bajo, ya que Postinor impide la ovulación y la fecundación. El embarazo ectópico puede continuar, a pesar de la aparición de hemorragia uterina.

No tome Postinor:

- Si tiene alergia conocida al principio activo levonorgestrel o a cualquiera de los excipientes.

Tenga especial cuidado con Postinor:

- Si se produce un embarazo tras el tratamiento con Postinor, debido a la posibilidad de un embarazo ectópico.
- Si padece un síndrome grave de malabsorción, como la enfermedad de Crohn, ya que puede disminuir la eficacia de Postinor.
- Si padece una enfermedad grave del hígado, no está recomendado el uso de Postinor.

Postinor no está recomendado para su uso en niñas, ya que los datos disponibles en adolescentes menores de 16 años son muy limitados.

Tras la ingesta de Postinor los periodos menstruales suelen ser normales y aparecen en la fecha prevista. En ocasiones puede producirse un adelanto o retraso de algunos días con respecto a la fecha prevista. Acuda a su médico para instaurar o adoptar un método convencional de anticoncepción. Si utiliza de forma habitual un método anticonceptivo hormonal y no aparece la menstruación en el periodo de descanso, tras la administración de Postinor, deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Postinor no es tan eficaz como un método anticonceptivo convencional y sólo está indicado como medida de emergencia. Si ha demandado tratamiento anticonceptivo de emergencia en reiteradas ocasiones, acuda a su médico para la adopción de un método anticonceptivo convencional.

La administración reiterada de Postinor dentro de un mismo ciclo menstrual está desaconsejada debido a la posibilidad de alteraciones en el ciclo.

Este medicamento no evita las enfermedades de transmisión sexual, incluido el SIDA.

Embarazo

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento.

Postinor no debe ser administrado a mujeres embarazadas. Dicho embarazo no se verá interrumpido como consecuencia de su administración.

Si se quedase embarazada a pesar de tomar este medicamento, consulte con su médico.

Lactancia

El levonorgestrel se excreta con la leche materna. La exposición del lactante al levonorgestrel puede reducirse si la ingesta de los comprimidos se realiza inmediatamente después de una toma y se evita la lactancia tras la administración de Postinor.

Conducción y uso de máquinas

No se conoce si Postinor tiene efecto sobre la capacidad de conducción y de manejo de maquinaria.

Toma de otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.

Si está siguiendo un tratamiento con Postinor deberá hacérselo saber al médico que vaya a recetarle cualquier otra medicación, para evitar interacciones entre varios medicamentos. Entre ellos están los barbitúricos (incluyendo la primidona), la fenitoína y la carbamazepina (tratamiento de epilepsia); las plantas medicinales con *Hypericum Perforatum* (Hierba de San Juan); la rifampicina y otros antibióticos; ritonavir (un fármaco antiviral); la rifabutina (un antibiótico) y la griseofulvina (un medicamento para el tratamiento de las infecciones por hongos).

Los medicamentos que contienen levonorgestrel pueden aumentar el riesgo de toxicidad de la ciclosporina.

3. CÓMO TOMAR POSTINOR 750 mcg comprimidos

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras instrucciones distintas.

Recuerde tomar su medicamento.

El tratamiento consiste en la toma de los dos comprimidos de Postinor.

Para obtener la máxima eficacia, debe tomar los dos comprimidos juntos lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de 72 horas después de haber mantenido relaciones sexuales sin protección. Si el tratamiento con Postinor es necesario, lo puede tomar en cualquier momento del ciclo menstrual siempre y cuando no se haya producido un retraso de la hemorragia menstrual.

La máxima eficacia se consigue si se toman los comprimidos lo antes posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de las 72 horas siguientes a la relación sin protección. Por tanto, no debe retrasar el inicio del tratamiento ya que la eficacia disminuye con el tiempo.

Si estima que la acción de Postinor es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico.

Actitud en caso de diarreas y vómitos

Si vomita o tiene diarreas antes de transcurridas tres horas desde la toma de los comprimidos de Postinor, o si presenta cualquier alteración del intestino que dificulte la absorción, es posible que la sustancia activa de Postinor no se haya absorbido por completo. En cualquiera de estas

situaciones póngase en contacto con su médico o con su Centro, ya que debería tomar otros dos comprimidos inmediatamente.

Si toma más Postinor del que debiera:

Si se han tomado varias píldoras a la vez, puede presentar náuseas o hemorragias vaginales.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, Postinor puede tener efectos adversos.

El efecto adverso más comúnmente notificado es la náusea.

Otros efectos adversos notificados tras la administración de Postinor son:

Órgano	Frecuencia de reacciones adversas	
	Muy frecuentes (> 1/10)	Frecuentes (> 1/100)
Sistema endocrino	Sangrado no relacionado con la menstruación.	Retraso en la menstruación de más de 7 días. Hemorragia irregular y manchado.
Sistema nervioso		Mareos. Dolor de cabeza.
Sistema gastrointestinal	Dolor en la zona inferior del abdomen. Náuseas	Diarrea. Vómitos.
Aparato reproductor y mamas		Aumento de la sensibilidad en las mamas.
General	Fatiga.	

El sangrado menstrual puede alterarse temporalmente, aunque la mayoría de las mujeres presentan la regla en los 7 días alrededor de la fecha esperada.

Si el siguiente periodo menstrual se retrasa más de 5 días, deberá realizarse un test de embarazo para descartar un posible embarazo.

Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE POSTINOR 750 mcg comprimidos

Mantener Postinor fuera del alcance y de la vista de los niños.

No almacenar a temperatura superior a 25°C.

Caducidad:

No utilizar Postinor después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Este prospecto ha sido aprobado en Abril de 2004.